



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 08 du 26 Mars 2003 - 1 page

COLZA : Stade E à F1

Charançons des siliques

Le vol se poursuit timidement, une cinquantaine de captures sont enregistrées à ce jour. Le colza n'est toujours pas aux stades sensibles (G1 à G4).

Il est trop tôt pour intervenir.

Pucerons cendrés

Leur montée en puissance se confirme, notamment sur le sud de la région et la façade atlantique. On atteint sur certaines parcelles des **niveaux de populations** compris entre **une et deux colonies au mètre carré**.

Intervenez avec un aphicide spécifique dès que vous observez deux colonies au mètre carré en moyenne.

Un traitement de bordure peut suffire dans un premier temps, si les colonies sont cantonnées à la périphérie des parcelles.

Maladies

Les **colzas** sont **très sains** dans l'ensemble. Le traitement en G1 (chute des premiers pétales) pourra être orienté sur **sclérotinia exclusivement**.

La formule la plus efficace et la plus économique reste le carbendazime à 500 g/ha.

Il est actuellement trop tôt pour intervenir, d'autant plus que les sclérotines n'ont pas encore pu germer. Ce traitement doit être placé en G1 et peut éventuellement être décalé si les conditions climatiques actuelles persistent (voir note commune du dernier bulletin).

POIS : Stade 2 à 6 feuilles

Sitones

L'activité des sitones se confirme, avec une situation très hétérogène, les parcelles indemnes cotoyant des parcelles approchant la note 2 (Voir Avertel).

Un traitement est nécessaire dès que vous atteignez la note 2 (4 à 10 à morsures en moyenne sur l'ensemble des folioles de la première feuille), avant le stade 6 feuilles ou 10 cm.

BLE : Stade redressement à épi 3 cm

La poursuite de la sécheresse (20 mm de pluie ces 50 derniers jours au lieu de 80 à 90 en année Normale) est **défavorable** à l'évolution de la culture et **aux maladies**.

Piétin-verse

Le risque climatique n'a pas progressé depuis le début du mois. La situation est hétérogène avec des parcelles pratiquement indemnes et quelques situations caractérisées par une fréquence de 10 à 25 % de plantes attaquées (en parcelles à risque parcellaire élevé en général).

** Stratégies à base de prochloraze seul: Intervenir dès que possible (le matin en cas de faible hygrométrie).*

** Autres stratégies : Il est trop tôt pour intervenir.*

Maladies foliaires

Septoriose

Elle est présente de façon classique sur les feuilles basses mais aucune nouvelle contamination n'a pu intervenir ces trois dernières semaines.

Rouille brune

Elle n'est pas préoccupante à court terme, les périodes froides puis l'absence de pluie ont été défavorables à la progression du risque depuis début Janvier.

Aucune intervention n'est justifiée à ce jour vis-à-vis de ces maladies (voir prochains bulletins).

ORGE DE PRINTEMPS

Pucerons

Pour l'instant, aucun vol n'a été observé à la tour. Maintenir la surveillance des parcelles, les conditions climatiques étant très favorables à ces ravageurs.



COLZA

Pucerons cendrés :

A surveiller

POIS

Sitones :

Situation hétérogène, intervenir si nécessaire

Service Régional de la
Protection des Végétaux
13, route de la Forêt
86 580 BIARD
Tél.: 05.49.62.98.25
Fax: 05.49.62.98.26

Directrice gérante :
S. DUTARTRE

Site Internet :
www.srpv-
poitoucharentes.com
E-mail :
srpv.draf-poitou-
charentes@agriculture.gouv.fr

Publication périodique
C.P.A.P. n°2139 AD
ISSN n°02294 470



7-10

40830